

XV
APRIL
1650





TESTES DE MINUTAS 43

XV



1058
24

TESTIS EXAMINATVS

á

VAVCLIO DATHIRIO BONGIARO D. A. P.

BENIGNE LECTOR.



VID sit testis, quæ ipsius natura, quibus conglobetur particulis, adeo scire arduum; vt quicumque diffusionis Authorum lectionibus, neglecta enchirisi, dumtaxat inhæserit, deducet potius, quam adducet: cum hic affirmet vnum, ille hoc idem de eadem perneget particula; Quasi idem omnino membrum Protei ad iustas toties mutaretur quociens tractatur, & inspicientium oculos vique satageret eludere.

Vasa spermatica præparantia testiculi Substantiam neutriquam ingreditur, ita autumat Mundin. Ingredduntur omnino, ita Vid. Vidu. Sylu. Barthol. Colomb. Subeunt quidem intus: Sed non omnia, moxiori dumtaxat ex parte, ita Highmor. Non: Sed minori tantum, ita censet Celeberrimus Marchett. P. m.

Galen. Melcr. Mundin. Laurent. Highmor. Barthol. Vesling. & alij quos taceo, plures, *genuinum testis Substantiam albam, mollem, laxam, glandulosam, statuunt. Riolan. eam deprehendit non vtique glandulosam, sed panisui fibrosam, quasi globulus fibrularum foret sibi inuicem scitule coaceruatam. Vesal. mens est, innumeram Vascularum minutissimorum conuerium in interori testicula luxuriare intersemita passim peculiaris carne; itaut ipsi loci vix non intelligant analogia testis respondent, Parenchyma proprium exilens. Francisc. Anton. Catto. testis Substantia rorunda, sibi, alba mollis, Vascularis tenuissimis intertexta.*

Semen per medias transire testis dogma Hippocraticum est bis inculcatum: Hinc neruus inligit Glisson. Lituam fibrosam describit Riol. ductum membranaceum per medius testis expansum, internum seminis delatorem, & describit, & depingit Highmor.

Qui e Dudyno egreditur inchoatum semen? Riolano per poros quatuor aut sex in extremis linea fibrosa, parulis. Highm. per ductum a se inuentum, Laurent. per exiles fistulas quibus epididymidis continuationem cum teste, habet. Vid. Vidu. per astra Bas eruarum ac V. vniuersum modo in lat. ribus epididymidis exsistentes. Vesling. semen de testibus ad parastatus variis vni transiferit, sed interim via non indicatur.

Epididymus quid sit: vix nouimus; ex doctrina Aristotel. est mentis durus ac hermusus, Galen. est media quadam substantia & fles int. v. & vasa. Vesling. corpus est glandulosum. Barth. cumque testis intus glandulosa similis, & fuscesca, exterius vero membranae Highm. epididymis principium glandulosum, reliquum autem vasculis pertextum est tenuissimis spissè circueantibus, interstissimorum ad insulas. Riolan. portio tota epididymis vniuersum vas est continuatum, intereum, plusculis ac complicitum vasis, & fibrulis ac fistulis præsum.

Iam ambigua non minus epididymidis origo, quam in doles. Spigel. Laurent. Vesling. eam à vasis spermaticis continuatione quadam repetunt. Id inficiatur VValeus. Bartholino placet ex ipse depulsa testis per fistulas exiles seu fibras candidas innuere.

Semini resti infusa in generatione Si Galen. Sylu. Mund. Riolan. &c. audiamus: Sin contra Aristotel. Fallop. Cabrol. Spigel. fauamus, huic nouitiam præstet mihi asterio:

Pugnantes ergo Authorum Semeni hinc inde distractus volui dubijs vticumque me expedire, crepi testem accuratius versare, patientius lacerare, curiosius introspicere; Et quid inde obseruarem, En tibi geminis produco FIG. Quarum I. est testis Virilis. II. Aprugni, vt in tumentiori mole clariora legantur omnia.

A. A. Vterque testis per medium scissus,

B. B. Tunica albuginea.

C. Vasorum præparantium in albuginea, in sercio.

D. D. Ductus Highmorianus per medios testes exporrectus, exactè in Aprugno; non item in Virili. An linea fibrosa Riolani inseparabilis à testis Tunica?

EEEE. Vasa præparantia albugineam perforantia, & ductui Semicirculari nexu commissa.

FFFF. Genuina testis Virilis substantia nullatenus glandulosa, sed omnino vasata: Itaut totus sit, totum vas, testis in Aprugno vasa interiacet testicularia***. leue stratum propriæ carnis. f f f f.

G. G. Exiles fistula, modo plures, modo pauciores, & ductui ubi statim ex albuginea emersit in capite testis, exorta.

H. H. Principium Epididymidis non glandulosum ex Highmor. Sed solis contextum vas ex Riol. valida sibi membrana inuicem aduersi. Hinc videre est Epididymida ex fistulis subortam, fistulas ex ductu: Atque adeo semen inchoatim generat in teste intra vasa testicularia, è quibus mox stillat in ductum, è ductu dein per fistulas conuehitur ad Epididymida, in cuius perplexitate tandem perficitur;

I. I. Reliqua Epididymidis series planè vasculosa, & ita in teste, & Epididymide Virilibus nil quidquam est glandulosa substantia.

K. K. Vas Eiacularium recta Epididymidis continuatio.

Interim te monui velim: Tri in hac Anatome sibi præstitissima desiderari. I. An vasa testicularia plura sint? An vticum, multiplex flexura breuiatur? 2. An, Vbi? & Quomodo coeant cum præparantibus, vt materiam hauriant seminalem? 3. Quæ, & Qua parte, ipsorum cum ductu intercedat connexio, feminis pro commentu.

Care um ad maiorem rei intelligentiam Adeas Highm. Tabulas X. XI. Alia si noueris hac in parte quæ meos lauerint oculos, euulges enixe rogo, meo aliorumque commodo; VALEAS.

Indit in humanis Divinum potentia ribus.

FIG. II.




FIG. I.





fi







